



**Public Health**  
Prevent. Promote. Protect.

## Departamento de Salud del Condado de Iredell Revisión Previo a la Vacunación del COVID-19



### Vacuna Pfizer o Moderna

### **Por favor, repásela antes de ser vacunado**

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, siglas en inglés) ha autorizado las vacunas del COVID-19 solo por uso de emergencia. Tiene la opción de aceptar o rechazar la vacuna del COVID-19. Los folletos que se le proporcionarán definen los importantes riesgos y beneficios conocidos y potenciales de la vacuna del COVID-19; todos los riesgos y beneficios potenciales no se conocen completamente en este momento.

#### **Estos individuos NO pueden ser vacunados:**

- Pfizer: Menos de 5 años- ***La vacuna no está aprobada para alguien que tenga menos de 5 años de edad.***
- Moderna: Menos de 18 años- ***La vacuna no está aprobada para alguien que tenga menos de 18 años.***
- Enfermedad moderada a severa el día de la cita- ***Espere hasta que se sienta mejor.***
- Positivo con el COVID-19 y experimentando síntomas- ***Espere hasta que se sienta mejor y haya terminado con el periodo de aislamiento.***
- Actualmente en el periodo de cuarentena debido a la exposición a alguien con el COVID- ***Regrese cuando haya terminado el periodo de cuarentena.***
- Un historial de miocarditis o pericarditis después de cualquier dosis de la vacuna del COVID-19- ***Se requiere consentimiento de su médico antes de la vacunación.***
- Una reacción alérgica a cualquier marca de la vacuna del COVID-19.
- Una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna, incluyendo cualquier de los siguientes:
  - Polietilenglicol (PEG), lo cual se encuentra en algunos medicamentos, tal como laxantes y los preparativos para el procedimiento de colonoscopías.
  - Polisorbato, que se encuentra en algunas vacunas, pastillas recubiertas con capa y esteroides intravenosos.
  - Una vacuna o terapia inyectable que contiene múltiples componentes, uno de los cuales es un componente de la vacuna del COVID-19 pero no se sabe cual componente provocó la reacción inmediata.
  - La vacuna aprobada para las edades 5-11: Trometamina y clorhidrato de Trometamina

#### **Estos individuos pueden vacunarse, pero se les informa de los riesgos/limitaciones:**

- Los hombres menos de 40 años: ***Hay un mayor riesgo de Miocarditis y Pericarditis (inflamación del corazón). El riesgo es más alto en hombres de 12 a 17 años de edad.***
- Capacidad de respuesta inmune debilitada, ya sea debido al uso de agentes inmunosupresores (irradiación, corticosteroides, etc) Infección del VIH, u otras causas- ***Puede tener una respuesta reducida de anticuerpos a la vacunación activa.***
- Actualmente tiene rellenos dérmicos- ***Puede ocasionar inflamación alrededor del relleno; comuníquese con su doctor si se desarrolla inflamación en o cerca del lugar de la obturación después de vacunarse.***
- Si usted está embarazada- ***No existe información de la seguridad de la vacuna del COVID-19 en las mujeres embarazadas. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la vacunación, platique con su profesional médico para tomar una decisión informada.***
- Si usted está amamantando- ***No existe información de la seguridad de la vacuna del COVID-19 en las mujeres en lactancia o los efectos en el lactante o la producción de leche/excreción de leche. La vacuna no contiene un virus vivo, por lo tanto, no se espera que perjudique al bebé. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la vacunación, platique con su profesional médico para tomar una decisión informada.***
- Historial del síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) o adultos (MIS-A): ***No existe información de la seguridad o la eficacia de la vacuna del COVID-19 en personas con un historial del síndrome inflamatorio multisistémico. El CDC recomienda que considere retrasar la vacunación por 90 días después del día del diagnóstico y hasta que se recupere de la enfermedad. Puede que desee hablar con su médico para ayudarlo tomar decisiones sobre el uso de una vacuna del COVID-19.***
- Miocarditis o Pericarditis no relacionado con recibir una vacuna del COVID-19: ***Puede recibir la vacuna del COVID-19 cuando la condición se haya resuelto completamente.***
- Recibió una vacuna del COVID-19 no autorizada o aprobada para el uso en los EEUU- ***Se puede vacunar con una vacuna aprobada de la FDA 28 días después de recibir la última dosis.***